

Questionário de triagem para pré-cadastro

Pergunta n.º	Pergunta de triagem	Ação a ser realizada
1.	<p>Você já teve alguma vez uma reação alérgica grave com risco de vida* (como anafilaxia) a uma dose anterior da vacina contra o COVID-19 da Pfizer-BioNTech ou a qualquer ingrediente da vacina (incluindo o polietilenoglicol)?</p> <p>OU</p> <p>Você já teve alguma vez uma reação alérgica de alguma gravidade dentro do prazo de 4 horas após receber uma dose anterior da vacina contra o COVID-19 da Pfizer-BioNTech ou alergia diagnosticada a um ingrediente específico da vacina (incluindo o polietilenoglicol)? (<i>Observação: as reações alérgicas podem incluir sintomas tais como urticária; inchaço da face, boca ou garganta; ou chiado e dificuldade para respirar</i>).</p> <p>Os ingredientes da vacina da Pfizer-BioNTech incluem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RNA mensageiro (mRNA) • Lipídeos: <ul style="list-style-type: none"> ○ ((4-hidroxiutil)azanodiil)bis(hexano-6,1-diil)bis(2-hexildecanoato) ○ 2[(polietilenoglicol)-2000]-N,N-ditetradecilacetamida ○ 1,2-distearoil-sn-glicero-3-fosfolina ○ Colesterol • Cloreto de potássio • Fosfato monobásico de potássio • Cloreto de sódio • Fosfato de sódio dibásico di-hidratado • Sacarose 	
	➤ SIM	NÃO administre a vacina da Pfizer-BioNTech ou da Moderna. Uma pessoa pode receber a vacina da Janssen se não houver contra-indicação a essa vacina (consulte a pergunta 3 abaixo), mas a pessoa <u>deve</u> primeiro conversar sobre seu histórico de alergia com seu prestador de cuidados primários e realizar uma avaliação clínica. A vacina da Janssen deve ser agendada para ser aplicada pelo menos 28 dias após qualquer dose prévia da vacina da Pfizer (caso aplicável).
	➤ NÃO	Prossiga para a pergunta n.º 2
2.	<p>Você já teve alguma vez uma reação alérgica grave com risco de vida* (como anafilaxia) a uma dose anterior da vacina contra o COVID-19 da Moderna ou a qualquer ingrediente da vacina (incluindo o polietilenoglicol)?</p> <p>OU</p> <p>Você já teve alguma vez uma reação alérgica de alguma gravidade dentro do prazo de 4 horas após receber uma dose anterior da vacina contra o COVID-19 da Moderna ou alergia diagnosticada a um ingrediente específico da vacina (incluindo o polietilenoglicol)? (<i>Observação: as reações alérgicas podem incluir sintomas tais como urticária; inchaço da face, boca ou garganta; ou chiado e dificuldade para respirar</i>).</p> <p>Os ingredientes da vacina da Moderna incluem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RNA mensageiro (mRNA) • Lipídeos: <ul style="list-style-type: none"> ○ SM-102 (propriedade da Moderna) ○ Polietilenoglicol [PEG] 2000 dimiristoil glicerol [DMG] ○ 1,2-distearoil-sn-glicero-3-fosfolina [DSPC] ○ Colesterol • Trometamina • Cloridrato de trometamina • Ácido acético • Acetato de sódio • Sacarose 	

	<p>➤ SIM</p>	NÃO administre a vacina da Moderna ou da Pfizer-BioNTech. Uma pessoa pode receber a vacina da Janssen se não houver contra-indicação a essa vacina (consulte a pergunta 3 abaixo), mas a pessoa <u>deve</u> primeiro conversar sobre seu histórico de alergia com seu prestador de cuidados primários e realizar uma avaliação clínica. A vacina da Janssen deve ser agendada para ser aplicada pelo menos 28 dias após qualquer dose prévia da vacina da Moderna (caso aplicável).
	<p>➤ NÃO</p>	Prossiga para a pergunta n.º 3
3.	<p>Você já teve alguma vez uma reação alérgica grave com risco de vida* (como anafilaxia) a uma dose anterior da vacina contra o COVID-19 da Janssen ou a qualquer ingrediente da vacina (incluindo o polissorbato)?</p> <p>OU</p> <p>Você já teve alguma vez uma reação alérgica de alguma gravidade dentro do prazo de 4 horas após receber uma dose anterior da vacina contra o COVID-19 da Janssen ou alergia diagnosticada a um ingrediente específico da vacina (incluindo o polissorbato)? (<i>Observação: as reações alérgicas podem incluir sintomas tais como urticária; inchaço da face, boca ou garganta; ou chiado e dificuldade para respirar</i>).</p> <p>Os ingredientes da vacina da Janssen incluem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Partículas inativadas de adenovírus • Ácido cítrico monohidratado • Citrato trissódico dihidratado • Etanol • 2-hidroxiopropil-β-ciclodextrina (HBCD) • Polissorbato 80 • Cloreto de sódio 	
	<p>➤ SIM</p>	NÃO dê a vacina da Janssen. Uma pessoa pode receber a vacina da Pfizer ou da Moderna se não houver contra-indicação a essa vacina (consulte a pergunta 1 e 2), mas a pessoa deve primeiro conversar sobre seu histórico de alergia com seu prestador de cuidados primários e realizar uma avaliação clínica.
	<p>➤ NÃO</p>	Prossiga para a pergunta n.º 3
4.	<p>Você já teve alguma vez uma reação alérgica severa com risco de vida* (como anafilaxia) a qualquer coisa (incluindo outros medicamentos, alimentos, substâncias, exposições ambientais, etc.)?</p> <p>OU</p> <p>Você já teve alguma reação alérgica de alguma gravidade dentro do prazo de 4 horas após ter recebido outra vacina ou terapia com medicamentos injetáveis (incluindo injeções de medicamentos em uma veia, músculo ou na pele)?</p>	
	<p>➤ SIM</p>	A pessoa pode agendar a vacinação, mas recomenda-se que converse primeiro sobre seu histórico de alergias e os potenciais riscos e benefícios da vacina com seu prestador de cuidados primários. Ofereça-lhe “ <i>Informações sobre a vacina contra o COVID-19 para pessoas com determinadas condições de saúde</i> ”. Quando receberem a vacina, elas irão ser observadas por 30 minutos após a vacinação.
	<p>➤ NÃO</p>	Prossiga para a pergunta n.º 5
5.	<p>Você recebeu uma terapia passiva de anticorpos para tratar o COVID-19 nos 90 dias anteriores (isto inclui plasma convalescente e anticorpos monoclonais, tais como bamlanivimab e casirivimab/imdevimab)? (<i>Observação: as vacinas contra o COVID-19 não devem ser administradas durante pelo menos 90 dias após uma pessoa ter recebido uma terapia passiva de anticorpos como tratamento contra o COVID-19 para evitar</i></p>	

	a possibilidade da terapia de anticorpos interferir com a vacina).	
	➤ SIM	NÃO agende a vacinação até que tenham decorrido 90 dias desde a terapia passiva de anticorpos.
	➤ NÃO	Prossiga para a pergunta n.º 6
6.	Você já recebeu outra vacina não relacionada (por exemplo, influenza) nos últimos 14 dias? (Observação: a vacina contra o COVID-19 deve ser administrada de forma isolada e pelo menos 14 dias depois de outras vacinas).	
	➤ Se Sim, qual foi a data de sua última vacinação com outra vacina? (Insira a data)	
	➤ SIM	NÃO agende a vacinação até que tenham decorrido 14 dias desde a época das outras vacinações.
	➤ NÃO	Prossiga para a pergunta n.º 7
7.	Você está gravemente imunocomprometido** (seu sistema imunológico está enfraquecido e não está funcionando corretamente)?	
	➤ SIM	A pessoa pode agendar a vacinação, mas recomenda-se que primeiro converse sobre a sua condição imunossupressora, e os potenciais riscos e benefícios da vacina com o prestador que está cuidando de sua condição. Ofereça-lhe as <i>“Informações sobre a vacina contra o COVID-19 para pessoas com determinadas condições de saúde”</i> .
	➤ NÃO	Prossiga para a pergunta n.º 8
8.	Você está grávida atualmente?	
	➤ SIM	A pessoa pode agendar a vacinação, mas recomenda-se que converse primeiro sobre a gravidez e os potenciais riscos e benefícios da vacina com seu prestador obstétrico. Forneça à pessoa as <i>“Informações sobre a vacina contra o COVID 19 para pessoas com determinadas condições de saúde”</i> .
	➤ NÃO	Fim

* As reações alérgicas graves com risco de vida incluem sintomas de anafilaxia, tais como inchaço do rosto, da boca ou da garganta; chiado ou dificuldade para respirar; perda repentina da pressão sanguínea, etc. geralmente exigindo que receba epinefrina e vá ao hospital.

** As condições severamente imunocomprometidas incluem tratamento quimioterápico para câncer, estar dentro de um ano após receber uma célula-tronco hematopoiética ou transplante de órgão sólido, infecção por HIV não tratada com uma contagem de linfócitos CD4 inferior a 200, distúrbio de imunodeficiência primária, altos níveis de esteróides, etc.